

Bescherming van de hulpverlener ten tijde van COVID-19

Algemeen:

- 1: draag een mondmasker bij elk contact; het type zal verschillen ifv de situatie (vide infra)
- 2: draag zone specifieke kledij die je minstens dagelijks kan verversen
- 3: vermijd het dragen van een doktersjas
- 4: ontsmet je handen na gebruik van medisch materiaal dat in contact was met de patiënte (cfr Bescherming Hygiënische maatregelen in raadplegings- en echo lokaal)


Op de raadpleging:

A: Patiënten hebben geen klachten:

Op de raadpleging

- ontsmet de handen met handalcohol voor elk nieuw contact
- draag een mondmakser bij elk contact (procedure of chirurgisch masker)
- draag de zone kledij die standaard voorzien is, en wissel dagelijks
- was de handen na elk patiënten contact grondig met water en zeep

B: Patiënten hebben klachten en er is een vermoeden van COVID-19:




Wanneer je de klachten vaststelt in het raadplegings- of echolokaal, voer dan het onderzoek uit. Zo er geen opname vereist is gaat de patiënte na het onderzoek weer naar huis. Is er een opname vereist dan breng je de patiënte onder in een deel van je eenheid toegewezen aan vermoedelijke COVID patiënten



Voor het betreden van de kamer	Bij het verlaten van de kamer
ontsmet de handen met handalcohol	doe de handschoenen uit
trek een beschermerschort aan	verwijder de beschermerschort
zet een procedure (chirurgisch) masker over mond en neus	verwijder de beschermbril
zet een beschermbril op of spatschem	ontsmet de handen met handalcohol
trek handschoenen aan	

Op de verloskamer:

A: Patiënten hebben COVID gerelateerde klachten en er is een vermoeden van COVID-19:



Voor het betreden van de kamer	Bij het verlaten van de kamer
ontsmet de handen met handalcohol	doe handschoenen uit
trek een beschemschort aan	verwijder de beschermerschort
zet een FFP2 masker op indien beschikbaar; zoniet gebruik een procedure- (chirurgisch) masker over mond en neus	verwijder de beschermbril of het spatscherm
zet een bescherm bril of spatscherm op	verwijder het masker zo nodig
trek handschoenen aan over de mouwen	ontsmet de handen met handalcohol

B: Patiënten hebben een bewezen COVID-19 infectie:

Voor het betreden van de kamer	Bij het verlaten van de kamer
ontsmet de handen met handalcohol	doe het paar handschoenen met korte manchet uit
trek handschoenen aan (eventueel lange manchet)	verwijder de schort
trek een ondoordringbare short aan met lange mouwen	verwijder de handschoenen met lange manchet
zet een FFP2 -masker over mond en neus	COVID
zet een (bril en) een spatscherm op	verwijder het spatschem (en bril)
IN DE KAMER	verwijder het masker
trek (eventueel) een 2de paar handschoenen aan (korte manchet)	ontsmet de handen met handalcohol