

Opvolgingsvoorstel algemene Gynaecologische Oncologie controle raadpleging in tijden van COVID-19 crisis

Update 30-03-2020

De onderstaande lijst geeft een richting aan en is niet exhaustief.

Indien bij contacteren van de patiënten, deze symptomen vermeldt, blijft de controle best behouden.

Indien tumormerkers boven normaalwaarden en/of in stijgende lijn, blijft de controle best behouden.

Indien recidief van de ziekte, dan tellen we voor opvolging verder op basis van datum laatste recidief (en telt datum diagnose dus niet!)

Besprekingsraadplegingen na MOC of bilanstaf worden omgevormd tot telefonisch consult in functie van resultaten.

Indien reden van consult niet te herleiden is naar één van de onderstaande categoriën, is overleg met supervisie aangewezen.

Oncologische pathologie	Opvolgingsvoorstel
ALLE tumoren >5 jaar ziektevrij	Uitstel mogelijk + 6 maanden
HGSOC 1 ^{ste} controle na adjuvante chemo 1 ^{ste} lijn <2 jaar na diagnose met onderhoudstherapie 1 ^{ste} lijn stadium I <2 jaar na diagnose zonder onderhoudstherapie 1 ^{ste} lijn >stadium I <2 jaar na diagnose zonder onderhoudstherapie 1 ^{ste} lijn alle stadia >2 en <5 jaar na diagnose 1 ^{ste} lijn in jaarlijkse opvolging Recidief met CT/MRI/PET om 3 maanden Recidief met CT/MRI/PET om 6 maanden	Geen controle meteen na chemo, best afspraak na 3 maanden Opvolging ifv olaparib/avastin/.. zo mogelijk voor meerdere cycli VS voorzien Controle voorzien + 3 maanden en CA125 via huisarts Afspraak Leuven om 3 maanden behouden Controle voorzien + 3 maanden en CA125 via huisarts Controle voorzien + 6 maanden en CA125 via huisarts Beeldvorming behouden en telefonisch consult resultaat na bilanstaf zo mogelijk Raadpleging en beeldvormingsafspraken (en bilanstaf!) +3 maanden
Borderline ovariumca Borderline stadium Ia-b-c na radicale heekunde Borderline > stadium I <2j na radicale heekunde Borderline >2j na radicale heekunde Borderline <2j na conservatieve heekunde (USO)	Controle + 6 maanden CA 125 (+CEA indien mucineus) via huisarts en controle + 3 maanden voorzien Controle + 6 maanden voorzien Controle + 3 maanden met echo gyn Leuven

<p>Borderline >2j na conservatieve heekunde (USO) Status na invasief implant / recidief</p>	<p>Controle + 6 maanden voorzien met echo gyn CA 125 (+CEA) via huisarts en controle + 3 maanden voorzien</p>
<p>LGSOC / Laaggradig endometriaal sarcoma Indien afspraak met beeldvorming en onderhoudstherapie Indien afspraak met jaarlijkse beeldvorming Indien tussentijdse klinische controle zonder beeldvorming</p>	<p>Afspraak en beeldvorming verschuiven + 3 maanden en VS opsturen Afspraak en beeldvorming verschuiven + 3 maanden Afspraak + 3 maanden</p>
<p>Trofoblastziekten Opvolging Mola Opvolging net na curettage of MTX Opvolging na EP/EMACO</p>	<p>hCG controle via huisarts continueren en afspraak (zo hCG nl) + 6 maand hCG controle via huisarts continueren en afspraak (zo hCG nl) + 3 maand hCG + cofo controle via huisarts en afspraak (zo hcg nl) + 3 maand</p>
<p>Granulosa of theca tumor / Sertoli Leydig Indien initieel gestegen AMH/ testosterone Indien geen opvolging via AMH/ testosterone mogelijk en stadium I Indien geen opvolging via AMH mogelijk en stadium I hoog risico, II, III en IV</p>	<p>Controle AMH/testosterone via huisarts, zo TM normaal controle + 3 maanden Controle met beeldvorming plannen + 6 maanden Controle met beeldvorming behouden OF + 3 maanden met beeldvorming</p>
<p>Kiemceltumoren Indien jaarlijkse opvolging met beeldvorming Indien geen beeldvorming gepland</p>	<p>Beeldvorming + 3 maanden en telefonisch contact resultaat Uitstel naar jaarlijkse controle met beeldvorming</p>
<p>Uterus Laaggradig endometrium (gr 1 en 2) stadium I en II Driemaandelijke controle Zesmaandelijkse controle Jaarlijkse controle Laaggradig endometrium (gr 1 en 2) ≥ stadium III tenzij >5jaar HG end. endca./clear cell/sereus adeno (graad 3) stadium I en II Driemaandelijke controle Zesmaandelijkse controle Jaarlijkse controle</p>	<p>Controle voorzien + 3 maanden Controle voorzien + 3 maanden Controle voorzien + 6 maanden Afspraak behouden Controle voorzien + 3 maanden Controle voorzien + 3 maanden Controle voorzien + 6 maanden</p>

<p>HG end. endca./clear cell/sereus adeno (graad 3) \geq stadium III tenzij >5j</p> <p>Sarcoma / Recidief endometriumca in opvolging</p> <p>Driemaandelijke controle</p> <p>Zesmaandelijkse controle</p> <p>Jaarlijkse controle</p>	<p>Afspraak behouden</p> <p>Controle voorzien + 3 maanden</p> <p>Controle voorzien + 3 maanden</p> <p>Controle voorzien + 6 maanden</p>
<p>Cervix (en vaginacarcinoma)</p> <p>LSIL, ASCUS HPV neg zonder VG invasieve tumor</p> <p>HSIL, ASC-H, ACG, vermoeden carcinoma op PAP</p> <p>ASCUS HPV16 of 18 positief</p> <p>Controle na LLETZ ikv HSIL</p> <p>1^{ste} afwijkende cytologie na VG invasieve tumor</p> <p>Invasief carcinoma eerste controle na HK of RT</p> <p>Invasief carcinoma status <2j na initiële heekunde of RT</p> <p>Invasief carcinoma status >2j na initiële heekunde of RT</p> <p>Recidief cervixca</p> <p>Status <1jaar na exentratie</p> <p>Status >1jaar na exentratie</p>	<p>Controle na COVID</p> <p>Afspraak behouden</p> <p>Afspraak behouden</p> <p>Uitstel kan tot 6-9 maanden na ingreep</p> <p>Afspraak behouden</p> <p>Controle voorzien + 3 maanden</p> <p>PAP via HA en afspraak voorzien + 3 maanden</p> <p>PAP via HA en afspraak voorzien + 6 maanden</p> <p>Controle voorzien + 3 maanden</p> <p>Controle voorzien + 3 maanden</p> <p>Controle voorzien + 6 maanden</p>
<p>Vulva</p> <p>VIN/VAIN zonder VG van invasieve tumor</p> <p>Invasief vulvaca in opvolging</p> <p>Driemaandelijke controle</p> <p>Zesmaandelijkse controle</p> <p>Jaarlijkse controle</p> <p>Invasief vulvaca in VG met nadien VIN</p>	<p>Controle + 3 maanden</p> <p>Controle + 3 maanden</p> <p>Controle + 3 maanden</p> <p>Controle + 6 maanden</p> <p>Controle + 3 maanden</p>
<p>Familiale opvolging</p> <p>Familiaal risico zonder tumor in VG en BRCAneg (IBIS <30%)</p> <p>Bewezen BRCA1/2 zonder tumor in VG en zonder profylactische HK</p>	<p>Afspraak en geplande onderzoeken +6 maanden</p> <p>Afspraak met onderzoeken behouden</p>

Bewezen BRCA1/2 met profylactische BSO + p mastectomie

Bewezen BRCA1/2 met profylactische BSO zonder pME

Bewezen BRCA1/2 zonder profylactische BSO met pME

Controle voorzien + 6 maanden

Afspraak met onderzoeken behouden

Controle voorzien + 3 maanden met echo gyn